



Αγκυλωμένα δόντια: Ορθοδοντική προσέγγιση

Π. ΠΑΝΟΣ

Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Tooth ankylosis: Orthodontic implications

P. PANOS

Postgraduate Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αγκύλωση των δοντιών αποτελεί κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε συγκλεισιακή διαταραχή. Η αιτιολογία της παραμένει άγνωστη, παρόλο που κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί ποικίλες και συχνά αντικρουόμενες απόψεις. Εμφανίζεται κυρίως στα νεογιλά δόντια και χαρακτηρίζεται από προϊούσα παραμονή του υπαίτιου δοντιού κάτω από το επίπεδο σύγκλεισης (ατελής σύγκλειση). Η αγκύλωση στη μόνιμη οδοντοφυΐα είναι λιγότερο συχνή και συσχετίζεται με τραύμα και έγκλειστα δόντια. Η αντιμετώπιση του εμπλεκόμενου δοντιού κυμαίνεται από απλή παρατήρηση μέχρι εξαγωγή. Παρουσιάζεται πρωτόκολλο αντιμετώπισης με στόχο τη σωστή διάγνωση και θεραπεία.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αγκύλωση δοντιού, ατελής σύγκλειση, δευτερογενής συγκράτηση, εμβύθιση.

Ελλ. Ορθοδ. Επιθ. 2003; 6: 75-88

Παρελήφθη: 17.12.2002 – Έγινε δεκτή: 22.01.2003

ABSTRACT

Tooth ankylosis is a condition, which may lead to an occlusal abnormality. The etiology is unknown although different and often contradicting opinions have been presented. It prevails on primary teeth, characterized by progressive infraocclusion. Ankylosis on permanent teeth is less frequent and is associated with trauma and impaction. Management of the affected tooth ranges from simple observation to extraction. A protocol assisting in the proper diagnosis and treatment is presented.

KEY WORDS: Tooth ankylosis, infraocclusion, secondary retention, submersion.

Hel. Orthod. Rev. 2003; 6: 75-88

Received: 17.12.2002 – Accepted: 22.01.2003